

2016年12月21日

報道関係各位

ジェネリック医薬品

**クロピドグレル錠 25mg/50mg/75mg「タナベ」**

**【効能・効果】、【用法・用量】の一部変更承認取得に関するお知らせ**

田辺三菱製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：三津家 正之）は、2016年12月21日にクロピドグレル錠 25mg/50mg/75mg「タナベ」について、下記のとおり、「効能・効果」および「用法・用量」の追加承認を取得しましたのでお知らせいたします。

これにより、「効能・効果」および「用法・用量」は先発品と同一となりますので、先発品と同様に処方していただけるようになりました。これらの製品は、連結子会社である田辺製薬販売株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：八田 雅夫）を通じて販売しております。

## 記

製品名	クロピドグレル錠 25mg/50mg/75mg「タナベ」
効能・効果 （下線部分が追加）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制</li> <li>・経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される下記の虚血性心疾患                急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞、ST上昇心筋梗塞）                安定性狭心症、陳旧性心筋梗塞</li> <li>・<u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制</u></li> </ul>
用法・用量 （下線部分が追加）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制の場合                通常、成人には、クロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与するが、年齢、体重、症状によりクロピドグレルとして50mgを1日1回経口投与する。</li> <li>・経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される虚血性心疾患の場合                通常、成人には、投与開始日にクロピドグレルとして300mgを1日1回経口投与し、その後、維持量として1日1回75mgを経口投与する。</li> <li>・<u>末梢動脈疾患における血栓・塞栓形成の抑制の場合</u>                通常、成人にはクロピドグレルとして75mgを1日1回経口投与する。</li> </ul>

以上

&lt;&lt; 本件に関するお問い合わせ先 &gt;&gt;

田辺三菱製薬株式会社 広報部

TEL：06-6205-5211